



# BOLETIM EPIDEMIOLÓGICO

## SÍFILIS

### DORES DE GUANHÃES

### MINAS GERAIS

08 de Dezembro de 2023



Elaborado por: Natalina Aparecida Ramos – Coordenadora da Vigilância em Saúde – Dores de Guanhaes

Apoio: Rodrigo Ferreira Drumond  
Izabela Viana Aniceto

## 1 SÍFILIS ADQUIRIDA


A sífilis é uma doença infecciosa sistêmica, causada pela espiroqueta *Treponema pallidum*, de evolução crônica, que ocupa uma importância significativa entre os problemas mais frequentes de saúde pública em todo o mundo. Pode apresentar várias manifestações clínicas e diferentes estágios (sífilis primária, secundária, latente e terciária). Nos estágios primário e secundário da infecção, a possibilidade de transmissão é maior.

A transmissão pode ser sexual, vertical ou sanguínea. A transmissão sexual é a predominante. Os sítios de inoculação do *Treponema pallidum* são, em geral, os órgãos genitais, podendo ocorrer também manifestações extragenitais (lábios, língua e áreas da pele com solução de continuidade).

A maioria das pessoas com sífilis são assintomáticas; quando apresentam sinais e sintomas, muitas vezes não os percebem ou não os valorizam, e podem, sem saber, transmitir a infecção às suas parcerias sexuais. Em formas mais graves da doença, como na sífilis terciária, se não houver tratamento adequado pode causar complicações graves como lesões cutâneas, ósseas, cardiovasculares e neurológicas, podendo levar à morte.




Gráfico 1 - Distribuição dos casos de sífilis adquirida no município de Dores de Guanhões - 2015 a 2023



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro

Gráfico 2 - Distribuição dos casos de sífilis adquirida por escolaridade no município de Dores de Guanhões - 2019 a 2021



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro

Gráfico 3 - Distribuição dos casos por raça/cor no município de Dores de Guanhões – 2019 a 2021



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro


2

## SÍFILIS EM GESTANTE

A transmissão vertical pode ocorrer durante a gestação e implicar em consequências como aborto, natimorto, prematuridade, morte neonatal e manifestações congênicas precoces ou tardias.


O acompanhamento das gestantes e de suas parcerias sexuais durante o pré-natal previne a sífilis congênita e é fundamental.

Gráfico 4 - Distribuição dos casos de sífilis em gestantes em Dores de Guanhões – 2015 a 2023



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro

Gráfico 5 - Distribuição dos casos de sífilis em gestantes por escolaridade no município de Dores de Guanhões - 2019 a 2021



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro



Gráfico 6 - Distribuição dos casos de sífilis em gestantes por raça/cor no município de Dores de Guanhões – 2019 a 2021



Fonte: SIM/SINAN/CVDANT/DVCC.DIE/SVE/SubVS/SESMG. Dados considerados em 07 de dezembro

### 3 SÍFILIS CONGÊNITA

É a transmissão da mãe com sífilis não tratada ou tratada de forma inadequada para a criança durante a gestação (transmissão vertical). Por isso é importante fazer o teste para detectar a sífilis durante o pré-natal, e quando o resultado for positivo, tratar corretamente a mulher e sua parceria sexual, para evitar a transmissão.

A maior parte dos bebês com sífilis congênita não apresentam sintomas ao nascimento. No entanto, as manifestações clínicas podem surgir nos primeiros três meses, durante ou após os dois anos de vida da criança.

São complicações da doença: abortamento espontâneo, parto prematuro, malformação do feto, surdez, cegueira, alterações ósseas, deficiência mental e/ou morte ao nascer.

No período de 2015 a 2023, não houve notificação de sífilis congênita no município de Dores de Guanhões.

### 4 TRATAMENTO

O tratamento de escolha é a Penicilina Benzatina (benzetacil), que é até o momento, a principal e mais eficaz forma de combater a bactéria causadora da doença.



## PREVENÇÃO

O uso correto e regular do preservativo masculino e/ou feminino é a medida mais importante de prevenção da sífilis, por se tratar de uma Infecção Sexualmente Transmissível.

## REFERÊNCIAS BIBLIOGRÁFICAS

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. *Guia de Vigilância em Saúde*, 5 ed., Brasília, 2022b. Disponível em <[https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia\\_vigilancia\\_saude\\_5ed\\_rev\\_atual.pdf](https://bvsms.saude.gov.br/bvs/publicacoes/guia_vigilancia_saude_5ed_rev_atual.pdf)>. Acesso em 7 de dez. 2023.

SECRETARIA DE ESTADO DE SAÚDE DO ESTADO DE MINAS GERAIS (SES-MG). *Dados de sífilis*. Disponível em: <<http://vigilancia.saude.mg.gov.br>> . Acesso em 07 de dez. 2023.

BRASIL, MINISTÉRIO DA SAÚDE. Manual Técnico para o Diagnóstico de Sífilis. Disponível em: <<file:///C:/Users/Saude/Downloads/manual-tecnico-para-o-diagnostico-da-sifilis.pdf>>. Acesso em: 7 de dez. 2023.